

Isparta'daki Porsuk *Meles meles* (Linnaeus, 1758)'in Populasyon Özellikleri

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ, Doç. Dr. Mehmet Ali TABUR, Ali KAYAHAN, İsmail Burak KARACEYLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümü

ÖZET: Palearktikte yaygın olarak görülen porsuk (*Meles meles*), açık alandaki yaprak dökken, kozalaklı ya da karışık ağaçlık bölgelerde dağılış gösterir. Sık çalılık, sazlık, maki ve nehirlerin yanı sıra tarımsal alan, mera, bozkır ve yarı çöllerde de yaşar. Genellikle yaşam alanlarının giriş yerini ağaç, sazlık ve kayalıkla örterler. Yer kurtları açısından zengin olan çayır ve ılıman iklime sahip yerleri tercih ederler. Yaşam alanlarının ortalama rakımı 1000 metredir. Endotermik, homoiterm ve eşeyssel dimorfizme sahiptirler. Genellikle çok eşlidir. Sosyal gruplarında, sadece dominant erkek ve dişi çiftleşir. Yıl boyunca ürerler ancak üreme sezonu kışın sonu ve baharın başlangıcı (Şubat-Mayıs) ve yaz sonu ile sonbaharın (Ağustos-Ekim) başındadır. Tarımsal ürünlere ve meyve bahçelerine zarar vermektedirler. Omurgasızlarla beslendiklerinden özellikle böceklerin biyolojik kontrolünde önemlidirler. Günümüzde, türün IUCN'nin tehdit listesindeki koruma statüsü düşük risk grubudur.

Bu çalışma, Isparta ve ilçelerinde 2013 yılında yapılan arazi gözlemleri ve yöre halkıyla yapılan kişisel görüşmelere dayanmaktadır. Isparta'da yaygın olarak bulunan bu türün korunmasına yönelik çalışmalara halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Porsuk, *Meles meles*, Tür biyolojisi, Isparta, Türkiye