

## **Isparta’da Kaya Sansarı *Martes foina* (Erxleben, 1777)’nin Populasyon Özellikleri**

Doç. Dr. Mehmet Ali TABUR, Prof. Dr. Yusuf AYVAZ, Cemal Çağrı ÇETİN,

Betül ŞİMŞEK, Ergin TURANTEPE

*Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü*

**ÖZET:** Kaya sansarı *Martes foina* (Erxleben, 1777) Avrupa ve Orta Asya’da y aprak döken orman ve dağlık habitatlarda yayılış gösterir. Bu hayvan terkedilmiş ineri, ağaç kovukları ve kaya oyuklarını yuva olarak kullanır. Kaya sansarının üreme mevsimi temmuz ve ağustos aylarıdır. Genelde nokturnal olan bu tür üreme döneminde diurnaldır. Karnivor olsalar da beslenme bakımından omnivor bir özelliğe sahiptirler. Kaya sansarı tehlike altında olmayan bir türdür ve bugün IUCN’e göre düşük risk kategorisindedir. Bu çalışma, Isparta ve ilçelerinde 2013 yılında yapılan arazi gözlemleri ve yöre halkıyla yapılan kişisel görüşmelere dayanmaktadır. Isparta’da yaygın olarak bulunan bu türün korunmasına yönelik çalışmalara halkın katılımının sağlanması gerekmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Kaya sansarı, *Martes foina*, Tür biyolojisi, Isparta, Türkiye