

2010-2012 yılları arasında Kızılırmak vadisinde toplam 263 kuş türü gözlenmiştir. Kuşlardan 93'ü yerli, 82'si yaz göçmeni, 51'i kış göçmeni ve 37'si transit göçerdir. IUCN kriterlerine göre; Küçük akbaba (*Neophron percnopterus*), uludoğan (*Falco cherrug*) ve kadife ördek (*Melanitta fusca*) tehlikede (EN) kategorisinde, yaz ördeği (*Marmaronetta angustirostris*), toy (*Otis tarda*) ve sarıkamışçın (*Acrocephalus paludicola*) hassas (VU) kategorisinde, pasbaş patka (*Aythya nyroca*), kızıl çaylak (*Milvus milvus*), bozkır delicesi (*Circus macrourus*), aladoğan (*Falco vespertinus*), büyük suçulluğu (*Gallinago media*), kaya keklığı (*Alectoris graeca*), çamurçulluğu (*Limosa limosa*), gökkuzgun (*Coracias garrulus*) ve alaca sinekkapan (*Ficedula semitorquata*) tehlide yakın (NT) kategorisindedir. Kızılırmak Deltasında kuşları olumsuz etkileyen faktörler arasında; saz kesimi, su rejimindeki değişim, nehir kenarındaki rekreasyonel aktiviteler, anız yakımı, tarım sahalarının genişletilmesi, kimyasal ve gürültü kirliliği sayılabilir.