

ÖZET

Giriş: Günümüzde travmaların %50 kadarını kafa ve yüz yaralanmaları oluşturmaktadır; bunların %5'inde maksillofasial bölgede kırıklar meydana gelmektedir. Çene yüz bölgesi kompleks kırık ve yumuşak doku yaralanmalarının tedavisi tek seanslı ve erken yaklaşımlarla sağlanmalıdır. İhmal edilmiş vakalarda fasiyal yapının travma öncesindeki fonksiyon ve estetiğinin sağlanması zorlaşmaktadır. **Olgu sunumu:** Trafik kazası sonucu çok parçalı fasiyal kırıkları olan 44 yaşındaki erkek hasta kliniğimize ağız açmada kısıtlanma şikayeti ile başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyografik muayenesinde tedavisinin ihmal edildiği ve kırıklara bağlı olarak fibröz ankiloz geliştiği görülmüştür. Hasta genel anestezi altında koronal ve intraoral yaklaşımlarla opere edilmiştir. **Sonuç:** Tedavi edilmemiş yüz iskeleti kırıkları ve tedavi edilmemiş deplase zigomatik ark kırıkları fibröz veya fibroosseöz ankiloza neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankiloz, zigomatik ark, temporomandibular eklem **ABSTRACT**